SYNLAB AUVERGNE	**Fiche de transmission de prélèvement de selles**	Ref : SE-PREA-DE-028-04 Version : 04 Applicable le : 22-06-2020

INFORMATIONS PATIENT

☐ **Mme** ☐ **Mlle** ☐ **M.** ☐ **Enfant Fille** ☐ **Enfant Garçon**

NOM Prénom : .....

Date de naissance : / /

Adresse :

Fixe : *Mobile :*

N° de Sécurité Sociale :

Indication	☐ Dépistage ☐ Systématique ☐ Bilan de contrôle

Renseignements cliniques

☐ Voyage récent, pays : .....

☐ Immunodépression ☐ Fièvre ☐ Suspicion de TIAC

Autre :

Antibiothérapie

☐ Pas d'antibiotique prévu ☐ Antibiotique envisagé après : .....

☐ Antibiotique déjà pris avant : .....

Résultats	☐ A poster ☐ Au laboratoire ☐ Par Internet (mySYNLAB)

INFORMATIONS PRELEVEMENT

Date et heure du prélèvement : / / à h

Conservation jusqu'au laboratoire :

☐ Température ambiante ☐ Réfrigérateur (+4°C)

Les préconisations du laboratoire concernant le recueil de l'échantillon de selles sont inscrites au dos de ce document. En cas d'examens multiples sur un même échantillon, veillez à respecter les conditions d'acheminement au laboratoire les plus restrictives.

RESERVE AU LABORATOIRE

Date de réception : ...../...../..... **Heure de réception** : .....h.....

Conformité accueil : ☐ OUI ☐ NON Opérateur : .....

Conformité technique : ☐ OUI ☐ NON Opérateur : .....

Remarque/NC :

PRECONISATIONS

Examen bactériologique des selles (= Coproculture bactérienne)

Dans le cas d'un prélèvement à visée diagnostique, le prélèvement doit être effectué avant toute prise d'antibiotique. Merci de préciser le contexte de la demande dans le volet correspondant (au recto).

Prélèvement à amener au laboratoire, dans les **2h à température ambiante** ou dans les **12h après conservation au réfrigérateur**.

Recherche de *Clostridium difficile* toxinogène

La recherche de Clostridium difficile toxinogène doit être réalisée uniquement sur des selles diarrhéiques.

Prélèvement à amener au laboratoire, dans les **2h à température ambiante** ou dans les **24h après conservation au réfrigérateur**.

Examen parasitologique des selles (= EPS)

Dans les 3 jours précédant l'examen, ne pas ingérer de médicament avec charbon ou baryte, ne pas utiliser de suppositoire ou de substance laxative, et adopter un régime pauvre en fibres végétales. Les renseignements cliniques sont importants pour l'interprétation des résultats : symptômes, notion de voyage (date, durée, lieu), d'immunodépression profonde, d'hyperéosinophilie ...

En cas d'examen négatif et selon la prescription, il est recommandé de réaliser cet examen sur 3 selles différentes, espacées de 48h au minimum, sur une période totale de 10 jours.

Un examen pour contrôle de guérison peut être demandé 15 jours après la fin d'un traitement prescrit à la suite d'un premier examen positif.

Prélèvement à amener au laboratoire dans les **4h à température ambiante**.

Examen virologique des selles

La recherche d'*Enterovirus* doit idéalement être réalisée dans les 3 à 5 jours suivant l'apparition des symptômes diarrhéiques.

Prélèvement à amener au laboratoire, dans les **6h à température ambiante** ou dans les **24h après conservation au réfrigérateur**.

Recherche de sang dans les selles

Eviter les anti-inflammatoires (sauf si l'analyse est demandée pour détecter les effets secondaires provoqués par la prise de ces médicaments). Ne pas effectuer le recueil des selles en période de menstruations, en cas de saignements provoqués par une constipation ou des hémorroïdes, ou en cas d'administration de médicaments par voie rectale.

En cas de résultat négatif, l'examen sera répété sur 3 prélèvements consécutifs, 3 jours de suite.

Prélèvement à amener au laboratoire, dans les **2h à température ambiante** ou dans les **24h après conservation au réfrigérateur**.